

Задание 5

1. Страдает оформление текста

- У автора минус и число в обозначении температуры оказались на разных строках, а также вместо тире в некоторых местах используется дефис.
- В разных местах в качестве знака минус используется то дефис, то тире.
- Обозначение диапазона температур меняет от предложения к предложению.
- Числа от большего в меньшему.
- После некоторых единиц измерения стоит точка, хотя по ГОСТу ее ставить не следует.

2. Отсутствует связность в некоторых предложениях

- Среднегодовая амплитуда температур в пределах $30 - 32^{\circ}\text{C}$, абсолютных максимальных и минимальных температур – $70 - 80^{\circ}\text{C}$.
- Снижению интенсивности естественного гумусонакопления способствует уменьшение активной массы, количественное обеднение почвенной флоры.
- “Вследствие малой мощности снежного покрова они низки, и промерзание почвы идет довольно глубоко.” под “они” подразумевается температура, т. е. следовало написать “она”.
- Особенности солонцов является их терморегулирующая роль, способность к набуханию, благодаря чему влага дольше и лучше сохраняется в корнеобитаемом слое и способность экранировать восходящий поток влаги с солями натрия, охраняя тем самым верхний гумусовый горизонт от чрезмерного засоления.
- Глубина залегания карбонатов зависит от глубины промачивания почвы и, следовательно, уменьшается к югу по мере уменьшения годовой суммы осадков. В темно-каштановых почвах – 20 см. На юге степей встречаются карбонатные разности степных почв, которые вскипают с поверхности.

- В фразе “что благоприятно возделывания сельскохозяйственных культур” явно присутствует несогласованность, возможно, пропущено слово “для”.
- В предложении “Среднеиюльские температуры в зоне колеблются от +22,5 до +24,5°С.” непонятно о какой зоне идет речь.
- В предложении “Летом значительная суточная амплитуда температур” отсутствует сказуемое и смысл предложения теряется.
- Проявляется в формировании особого почвенного горизонта, насыщенного карбонатами кальция («известки»), который подстилает снизу гумусовый горизонт и служит экраном для веществ, выносимых из него нисходящим водным потоком.

3. В тексте присутствуют опечатки

- Нарисательное слово с большой буквы не в начале предложения: “На поверхности Продолжительность периода с температурой выше +5°С - от 170 дней в северных районах до 209 дней на юге, что благоприятно возделывания сельскохозяйственных культур. ”
- Отсутствие разделительного символа между словами: “В теплый период осадков выпадает больше, чем в холодный, и количество их по годам сильно варьирует.”

4. Ошибки:

- В тексте используется неверное словосочетание “конуса выносов”. Во-первых, конус во множественном числе – это конусы, во-вторых, конусы выноса, а не конусы выносов.
- Автор использует фразу “мощность снега”. Такого термина нет, возможно, имелась ввиду мощность снежного покрова.
- Лишние запятые: “Это связано, прежде всего, с засоленными почвообразующими породами и неглубоким залеганием сильноминерализованных грунтовых вод”.
- Не хватает запятой перед “как”: “В целом на формирование почв в сухостепной зоне оказывают влияние такие процессы почвообразования как гумусонакопление, карбонатизация и осолонцевание.”
- Естественный растительный покров степей характеризуется богатством видов и большой видовой насыщенностью.

5. Злоупотребление абзацами и короткими несвязными предложениями.

6. Злоупотребление разговорными словосочетаниями:

- Проявляется в формировании особого почвенного горизонта, насыщенного карбонатами кальция («известки»), который подстилает снизу гумусовый горизонт и служит экраном для веществ, выносимых из него нисходящим водным потоком.
- Характернейшей особенностью степного ландшафта является развитие кустарниковых зарослей, образованных крушиной, терном, бобовником, дерезой, спиреей, шиповником, жимолостью.
- Повышенное содержание углекислой извести (карбонатность), формирует важнейшие черты степных биогеоценозов, вызывая ксерофитизацию растительности.
- Карбонаты могут либо залегать в виде крупных мучнистых прослоек, либо рассеиваться в виде так называемой белоглазки – небольших локальных включений округлой формы.
- На юге степей встречаются карбонатные разности степных почв, которые вскипают с поверхности.
- При этом возделывание картофеля, овощей и бахчевых также тяготеет к водным источникам, так как в подавляющем большинстве случаев осуществляется с применением орошения.